


	Kultur	Schädling	Lateinischer Name	Capirel <i>S. felinae</i>	Casea <i>S. carpocapsae</i>	Zeitpunkt	Anwendung	Entwicklungsstadium	Dosierung
Kernobst	 <p>Äpfel / Birnen</p>	Apfelwickler	<i>Cydia pomonella</i>	☑		Herbst/Frühjahr	An die Basis der Hauptäste, an die Stämme und auf die Bodenoberfläche in einem Meter Abstand von jeder Seite der Reihe sprühen	Überwinternde Larve	1,5 Mrd/ha
		Pfirsichwickler	<i>Cydia molesta</i>	☑		Herbst/Frühjahr	An die Basis der Hauptäste, an die Stämme und auf die Bodenoberfläche in einem Meter Abstand von jeder Seite der Reihe sprühen	Überwinternde Larve	
		Fruchtschalenwickler	<i>Adoxophyes orana</i>	☑		Herbst/Frühjahr	An die Basis der Hauptäste, an die Stämme und auf die Bodenoberfläche in einem Meter Abstand von jeder Seite der Reihe sprühen	Überwinternde Larve	
		Apfelbaumglasflügler	<i>Synanthedon myopaeformis</i>	☑		Herbst/Frühjahr	Stämme	Larve	
		Pflaumensägewespe	<i>Hoplocampa</i> spp.	☑		Frühjahr: vor der Blüte Frühjahr/Sommer: bei Fruchtfall	Boden	Adulte, vor Erscheinen Larve	



Koppert

Während pflanzenparasitische Nematoden zu den häufigsten Bodenschädlingen gehören, von denen Pflanzen befallen werden, spielen entomopathogene Nematoden eine wichtige Rolle bei der biologischen Bekämpfung vieler Schädlinge. Dies gilt umso mehr für Schädlinge, die schwer zu bekämpfen sind und bei denen chemische Pflanzenschutzmittel nicht wirken oder schlichtweg nicht mehr verfügbar sind. Insektenpathogene Nematoden können zur Bekämpfung eines breiten Schädlingsspektrums in Kern- und Steinobst, wie Äpfeln und Pfirsichen, sowie in Kartoffeln und Freilandgemüse, wie Zwiebeln, Spargel und Bohnen, eingesetzt werden.

- Schnell wirksame biologische Lösung
- Schädlinge können keine Resistenz aufbauen
- Können mit herkömmlichen Spritzgeräten ausgebracht werden
- Kompatibel mit den meisten Pflanzenschutzmitteln
- Hinterlassen keine Rückstände

Dies ist eine Übersicht der Nematoden-Schädlinge-Kombinationen, die bisher erfolgreich getestet wurden. Wenn ein bestimmter Schädling nicht erwähnt wird, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass er nicht mit Nematoden bekämpft werden kann. Koppert erforscht ständig neue Anwendungsbereiche. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Koppert-Berater. Prüfen Sie immer das Etikett für umfassende technische Hinweise!

Insektenpathogene Nematoden

Eine biologische & wirksame Lösung zur Bekämpfung vieler Schädlinge in diversen landwirtschaftlichen Kulturen

Teil der IPM-Toolbox

Nematoden sind zu einem wichtigen Bestandteil von IPM-Lösungen geworden, die den Einsatz herkömmlicher Pestizide entweder teilweise oder sogar ganz ersetzen. Nematoden sind mit vielen Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden und auch Nematiziden kompatibel, was bedeutet, dass sie ihre Wirksamkeit nicht verlieren, wenn sie ergänzend zu chemischen Mitteln eingesetzt werden.

Mehr als 35 Jahre Erfahrung

Seit 1986 produziert Koppert Nematoden. In die Auswahl, Züchtung und Qualitätskontrolle dieser Nematoden sind viele Jahre an Erfahrung eingeflossen. Jede der von Koppert produzierten entomopathogenen Nematoden wurde für die Bekämpfung bestimmter Schadinsekten ausgewählt. Koppert produziert spezifische Stämme von *Steinernema feltiae*, *Steinernema carpocapsae* und *Heterorhabditis bacteriophora*.

